



Hautschutzplan

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Humanmedizin

Dr. Schumacher

- Typische Gefährdungen der Haut:
- häufiges Händewaschen
 - Kontakt mit aggressiven Substanzen
 - langes Tragen von Schutzhandschuhen
 - häufiger Kontakt mit Feuchtigkeit

Achtung: Bitte keinen Schmuck an Händen und Unterarmen tragen!

	Wann	Wie	Womit
 <p>Hygienische Händedesinfektion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vor direktem Patientenkontakt • vor direktem aseptischer Tätigkeit • nach direkten Patientenkontakt • nach Kontakt mit potentiell infektiösen Materialien • nach Kontakt mit der direkten Patienten Umgebung • nach dem Ablegen von Einmalhandschuhen 	<p>Ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel in die hohlen trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit durch das unverdünnte Präparat feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ASEPTOMAN MED alkoholisches Händedesinfektionsmittel, hervorragend hautverträglich, begrenzt viruzid PLUS 30 s <input type="checkbox"/> ASEPTOMAN FORTE alkoholisches Händedesinfektionsmittel, auf Ethanolbasis mit Rückfetter begrenzt viruzid PLUS 30 s <input type="checkbox"/> ASEPTOMAN PARFÜMFREI¹ alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit Rückfetter begrenzt viruzid 30 s <input type="checkbox"/> ASEPTOMAN VIRAL¹ viruzides alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit Rückfetter viruzid 1 min begrenzt viruzid PLUS 30 s <input type="checkbox"/> DESCODERM¹ alkoholisches, parfümfreies Händedesinfektionsmittel* 30 s
 <p>Hautschutz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn • vor dem längeren Tragen von Handschuhen • nach dem Händewaschen 	<p>Hautschutzcreme dünn auf die sauberen und trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren. Handgelenke, Nagelfalze, Fingerkuppen und Fingerzwischenräume beachten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DESCOLIND EXPERT PROTECT CREME
 <p>Schutzhandschuhe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • bei Kontakt mit Blut, Sekreten oder Ausscheidungen (z. B. Blutentnahme, Injektionen, Wundversorgung) • bei Anwendung wirkstoffhaltiger Produkte (z. B. Cortisonpräparate) • beim Umgang mit Gebrauchslösungen von Flächendesinfektions-, Instrumentendesinfektions- oder Reinigungsmitteln 	<p>Handschuhe nur auf trockenen und sauberen Händen tragen. Bei längeren Tragezeiten Handschuhe wechseln. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe eine hygienische Händedesinfektion durchführen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NITRIL-EINMALHANDSCHUH DIN EN 374-1 <input type="checkbox"/> NITRIL-EINMALHANDSCHUH 300 mm lang (mit langen Stulpen), DIN EN 374-1
	<ul style="list-style-type: none"> • beim Umgang mit Desinfektions- und Reinigungskonzentraten 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH 300 mm lang (mit langen Stulpen), DIN EN 374-3 CAT III
 <p>Hände waschen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • bei Arbeitsbeginn • bei sichtbarer Verschmutzung • nach Toilettenbenutzung • bei potentieller Kontamination der Hände mit Bakteriensporen oder Parasiten-/Wurm(eiern) • ggf. bei Arbeitsende 	<p>Waschlotion mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen, Hände und Fingerzwischenräume gründlich abspülen und sorgfältig mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.*</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DESCOLIND COMFORT WASH <input type="checkbox"/> DESCOLIND PURE WASH <input type="checkbox"/> DESCOLIND EXPERT WASH
 <p>Hände pflegen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • am Arbeitsende 	<p>Hautpflegecreme dünn auf die sauberen und trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren. Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Nagelfalze beachten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM <input type="checkbox"/> DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM <input type="checkbox"/> DESCOLIND PURE LIGHT CREAM <input type="checkbox"/> DESCOLIND PURE INTENSIVE CREAM <input type="checkbox"/> DESCOLIND EXPERT LIGHT CREAM <input type="checkbox"/> DESCOLIND EXPERT INTENSIVE CREAM

* entspricht der Empfehlung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

¹ Pflichtangaben nach § 4 Heilmittelwerbegesetz (HWG) auf der Rückseite.

Hautschutzplan erstellt auf der Grundlage der Empfehlungen der BgV sowie der TRGS 401.

Dieser Hautschutzplan stellt eine Empfehlung dar und ist an die individuellen Gegebenheiten anzupassen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

PSP-000613
09/2021



Dr. Schumacher

Pflichttextangaben nach § 4 Heilmittelwerbegesetz (HWG)

ASEPTOMAN® PARFÜMFREI

Wirkstoff: 2-Propanol. Alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Lösung zur Anwendung auf der Haut.
Zul.-Nr.: 45431.00.00

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 2-Propanol 63,14 g. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, gereinigtes Wasser. Enthält Wollwachs.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bakterizid inkl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), levurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-Vitro-Versuchen gegen BVDV und Vacciniavirus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. HBV/HIV, HCV.

Gegenanzeigen: Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen: Alkoholisches Händedesinfektionsmittel und Wollwachs können zu lokalen Unverträglichkeitsreaktionen führen. Auftretende Nebenwirkungen bitte dem Arzt oder Apotheker mitteilen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung: Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 22 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft, in schweren Fällen Koma.

Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen. Eine Anwendung bei Säuglingen darf nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Elektrische Geräte erst nach Auftrocknung benutzen.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

Stand der Information: 07/2015

ASEPTOMAN® VIRAL

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.)/ 57,6 g Ethanol 96 % pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Zusammensetzung: Wirkstoffe: 100 g Flüssigkeit enthalten: 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 57,6 g Ethanol 96 %. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanol, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Parfum Fresh. Enthält Wollwachs und 1,8 g/100g Propylenglycol. Enthält einen Duftstoff mit (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin.

Anwendungsgebiete: ASEPTOMAN VIRAL wird angewendet zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Anwendung auf Schleimhäuten, im Augenbereich und offenen Wunden nicht geeignet.

Wirkspektrum: bakterizid (inkl. Mycobacterien), fungizid, viruzid.

Gegenanzeige: ASEPTOMAN VIRAL darf nicht angewendet werden, bei Allergie gegen 1-Propanol, Ethanol, (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Cumarin oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei mehrfacher Anwendung kann es zu Irritationserscheinungen der Haut (z.B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) und bei hochfrequenter Anwendung auch zu weiter gehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Das Ausmaß und der Schweregrad dieser Erscheinungen hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegemaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Irritationserscheinungen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren. (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin können allergische Reaktionen hervorrufen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von ASEPTOMAN VIRAL: ASEPTOMAN VIRAL darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einen der Inhaltsstoffe von ASEPTOMAN VIRAL sind. Enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Dieses Arzneimittel enthält 1,8 g Propylenglycol pro 100 g. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. ASEPTOMAN VIRAL ist alkoholhaltig und brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte die mit ASEPTOMAN VIRAL eingeriebene Haut gut trocknen lassen. Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin. (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal und Cumarin können allergische Reaktionen hervorrufen.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

Stand der Information: 11/2020

DESCODERM

Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel 2-Propanol 70% (V/V) Lösung
Zul.-Nr.: 1599.98.99

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge.

Gegenanzeigen: Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, T +49 5664 9496-0, info@schumacher-online.com

Stand der Information: 09/2017